

تركيب جهاز القسطرة المركزية La pose d'une chambre implantable

قد يكون من الصعب إدخال العلاج الكيميائي في الأوردة الصغيرة للذراعين. فالذراع منطقة حساسة والحقن المتكرر يصبح بسرعة أمر مؤلم. ولهذا السبب نقترح غالباً وضع جهاز قسطرة مركزية قبل العلاج الكيميائي. يُسمّى أيضاً "port-à-cath" أو "PAC".

ويتكون هذا الجهاز من علبة صغيرة ومن قسطار (أنبوب مرن ورفيع). ويوضع بشكل كامل تحت الجلد، خلال عملية جراحية قصيرة تحت التخدير المحلي. إذا تم التخطيط لعملية جراحية قبل العلاج الكيميائي (إزالة الورم)، يمكن للجراح أن يغتنم هذه الفرصة لتنشيط الجهاز أثناء العملية الجراحية تحت التخدير العام.

توضع العلبة على مستوى الصدر وهي موصولة بالقسطار الموجود في وريد، معظم الأحيان وريد كبير عند قاعدة الرقبة.

عند القيام بعملية الحقن خلال العلاج الكيميائي، تُحقن الأدوية مباشرة في جهاز القسطرة عبر الجلد.

يظل الجهاز في مكانه خلال كل فترة العلاج ويتيح ممارسة نشاطات رياضية طبيعية والاستحمام والسفر، إلخ.

في معظم الحالات يتم احتمال القسطار وجهاز القسطرة المركزية بشكل جيد. ولكن يمكن الاحساس بانزعاج في السيارة بسبب حزام الأمان. في حال الألم أو الالتهاب أو السيلان غير الطبيعي من جهاز القسطرة المركزية، يجب عليك إعلام طبيبك بالأمر.

عندما لا يعود الجهاز ضرورياً، تتم إزالته خلال عملية جراحية قصيرة.

جهاز القسطرة الوريدية المركزية

