

化療藥物的給藥途徑分為以下幾種：靜脈注射（最為常見）、口服（吞食片劑）以及直接植入腫瘤，最後一種途徑較為罕見。

有時，在開始靜脈化療前，醫師會向您提出，為您安裝一支導管（普通導管或植入式靜脈輸液港）。靜脈注射導管是安裝在靜脈內用於注射化療藥物的軟質細管。導管可以降低血管受損的風險，並方便化療輸液。患者也會感到更加舒適，因為不必承受每次紮針的痛苦。

每次化療前，醫務人員要為您驗血，並將血檢結果製成**治療前評估**，以便腫瘤科醫師核實您的病情。

根據化療方案而定，輸液的時間短則幾分鐘，長則數小時。一天或數天之內可能需要連續輸液。

根據您的治療情況而定，醫師可能為您開出**治療嘔吐的藥物（止吐劑）或防止過敏反應的藥物（抗組胺藥物）**。醫師還可能為您開出化療的**附加藥物**，如維生素，以緩解化療藥物對健康細胞的毒性，並且/或者降低某些副作用。醫師為您開出的附加藥物是您治療方案的組成部分。

您可以在**日間醫院**接受化療靜脈輸液，在此情況下，您無需住院，只需在醫院逗留幾小時。若輸液將持續數天，您**需要住院**，以便醫護人員對您的病情進行監控。

化療藥物的給藥過程並不痛苦。但是，化療藥物會引起一些副作用。醫師將在定期檢查時對腫瘤的治療效果以及您接受化療藥物的情況進行評估。基於這些因素，醫師可能調整您的化療進程和持續時間。因此，您的化療總時間可能會改變。
