

安裝植入式靜脈輸液港 (La pose d'une chambre implantable)

在手臂等部位的小靜脈注射化療藥物有一定的難度。小靜脈較為脆弱，重複穿刺將迅速變得十分痛苦。因此，醫師通常會建議您安裝一個植入式靜脈輸液港。法語稱 port-à-cath®或 PAC。

該裝置由一個小盒子（植入式靜脈輸液港）和一支導管（軟質細管）組成。醫師將透過手術將其全部埋植於患者皮下。該手術過程短，患者只需局部麻醉。若化療前患者需接受手術（切除腫瘤），外科醫生可以利用這次手術機會，在患者全身麻醉下，為其安裝該裝置。

靜脈輸液港將被安裝在胸部，與其相連的導管則伸入靜脈——通常是頸部大靜脈。

每次化療輸液時，藥物將透過皮膚直接注射到植入的靜脈輸液港中。

該裝置將在整個治療期間留置在您的體內，您可以從事正常的活動，如洗澡或旅行等。

在大多數情況下，導管和植入式靜脈輸液港均能被患者很好地接受。但在乘車或開車時，安全帶的擠壓可能讓患者感到不適。若出現疼痛、炎症或有液體從植入式靜脈輸液港異常流出的情況，您應當向您的醫師彙報。

當不再需要該裝置時，醫師可透過簡單的外科小手術將其取出。

帶植入式靜脈輸液港的靜脈導管

